

# UNE PRISE EN CHARGE PLUS PROBLÉMATIQUE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES DANS LES ZONES NON LOTIES DE OUAGADOUGOU ?

## Equipe de recherche

Lankoandé Y.B.  
Compaoré Y.  
Dianou K.  
Sanogo S.  
Soura A.  
Maiga A  
& Amouzou A.

### Faits saillants

- Une prévalence de maladies non transmissibles légèrement plus élevée en Zone lotie
- Les adultes en zones non-loties font moins recours aux soins de santé en cas de MNT
- Le recours aux soins est limité en cas d'autres maladies cardiovasculaires, d'infections pulmonaires chroniques et de rhumatismes comparativement aux cas d'hypertension et de diabète.

## INTRODUCTION

La population de la ville de Ouagadougou, particulièrement la frange adulte, est de plus en plus exposée aux maladies non transmissibles en raison des changements de mode de vie et de l'allongement de la vie. Ces MNTs, nécessitant des prises en charge continues souvent toute la vie, sont peu connues des populations. Cela pose donc le problème de recours aux soins face à ces maladies dans un contexte où une très faible couche de la population peut bénéficier d'une assurance maladie. En exploitant des données riches collectées dans l'OPO, cette note examine les inégalités entre quartiers formels et informels en matière de recours aux soins en cas de Maladie Non Transmissible dans la ville de Ouagadougou.

## APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

L'enquête sur le recours aux soins chez les adultes en cas de maladies non transmissibles a été réalisée du 21 Mars au 20 Avril 2022 dans les zones de l'Observatoire de Population de Ouagadougou (OPO). Elle avait pour objectif de retracer les comportements de recours aux soins en cas de maladies non transmissibles dans

un contexte où leur poids pèse de plus en plus sur la mortalité des adultes. L'étude a été réalisée dans la zone de l'OPO qui couvre trois quartiers non lotis (Nioko 2, Nonghin et Polesgo) de 58269 habitants et deux quartiers lotis (Kilwin et Thangin) de 32399 habitants.




# PRINCIPAUX RÉSULTATS

## Une prévalence de maladies non transmissibles légèrement plus élevée en Zone lotie

La morbidité liée aux maladies non transmissibles n'est pas négligeable chez les adultes résidant dans les zones de l'OPO. En effet, plus d'une personne sur cinq parmi les adultes de 25 ans et plus souffre d'une MNT (21,13%). Comparativement aux zones non loties, le niveau de la prévalence est légèrement plus élevé dans les zones loties ( Figure 1).


Figure 1 : Prévalence de MNTs Déclarées (%)



## Les adultes en zones non-loties font moins recours aux soins en cas de MNT


Près d'un adulte sur trois souffrant de Maladie non transmissible n'a pas consulté un professionnel de santé au cours de l'année précédant l'enquête. Le non recours aux soins est plus prononcé dans les quartiers non-lotis (Figure2).

Figure 2 : Prévalence de recours aux soins selon la zone d'habitation (%)



## Le recours aux soins est limité pour certaines maladies non transmissibles

Parmi les maladies concernées, les malades du diabète et de l'hypertension font beaucoup plus recours aux soins comparativement aux patients souffrant des autres pathologies. La proportion de personnes ayant recours aux soins en cas de diabète et d'hypertension sont au-dessus de la barre de 75% tandis que les niveaux sont de 44,64%, 60,61% et 50% respectivement pour les patients souffrant de rhumatisme, d'autres maladies cardiovasculaires et de maladies pulmonaires. Les inégalités de recours aux soins entre les deux types de quartiers varient également selon le type de maladie.



Source: données des observatoires; calcul des auteurs.

## RECOMMANDATIONS POUR L'ACTION

- Sensibiliser les populations sur les principaux facteurs de risque des MNT ;
- Sensibiliser les populations des zones non loties sur l'utilisation des services de santé en cas de MNT ;
- Accélérer la mise en place de l'assurance maladie pour la prise en charge des couches vulnérables en cas de MNT

### Observatoire de Population de Ouagadougou

#### Pour en savoir plus

LANKOANDE Y. B., COMPAORE Y., SOURA A., DIANOU K., SANOGO S. (2022). Recours aux soins en cas de Maladies non-transmissibles à Ouagadougou : quel effet du type de quartier (loti/non loti)?

Institut Supérieur des Sciences de la Population [www.issp.bf](http://www.issp.bf)

Contacts : [lankym@yahoo.fr](mailto:lankym@yahoo.fr)